


Современные подходы к лечению герпесвирусной инфекции



VALV-RU-00397-DOC-11.2023

Общество с ограниченной ответственностью «Тева»

Россия, Москва, 115054, ул. Валовая, д. 35 | Тел. +7(495)644-22-34 | Факс +7(495)644-22-35 | www.teva.ru

Представленные данные отражают точку зрения автора, которая может не совпадать с мнением ООО «Тева»

Отпускается по рецепту. Предназначено для информирования специалистов здравоохранения. Не предназначено для демонстрации пациентам

Валвир

Удобная* терапия лабиального герпеса^{2,4}, которая способствует предотвращению развития симптомов «простуды на губах» при приеме на стадии предвестников^{1,2}

- ✓ **Воздействует непосредственно на причину заболевания¹, что способствует предотвращению развития симптомов «простуды на губах»¹⁻⁴**
- ✓ **Имеет удобный альтернативный** однодневный режим приема: 2000 мг (2 таблетки по 1000 мг) 2 раза в сутки в течение 1 дня¹**
- ✓ **Способствует ускорению процесса исчезновения симптоматики (кожных высыпаний, зуда и т.д.)^{3,4}**

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Валвир <http://grls.rosminzdrav.ru>, доступ от 25.11.2022.

2. Халдин А.А. Воспроизведенные ациклические синтетические нуклеозиды в этиотропной терапии рецидивов простого герпеса, Клиническая дерматология и венерология №2/2014, 79-83.

3. Spruance S.L., Jones T.M., Blatter M.M., et. al. High-dose, short-duration, early valacyclovir therapy for episodic treatment of cold sores: results of two randomized, placebo-controlled, multicenter studies. Spruance Antimicrob Agents Chemother. 2003 Mar;47(3):1072-80.

4. Горячкина М.В., Белоусова Т.А., Эпизодическая и супрессивная терапия простого герпеса ациклическими нуклеозидами, Клиническая дерматология и венерология №4/2014, с. 68-74.

* Имеется в виду снижение кратности/частоты приема по сравнению с ацикловиром.

** Альтернативная схема лечения рецидива лабиального герпеса. Вторая доза должна быть принята примерно через 12 ч (но не раньше, чем через 6 ч) после первой дозы



Валвир

удобная терапия*^{3,4} генитального герпеса¹,
которая способствует сокращению
длительности эпизода заболевания²

- ✔ **Системно и специфически** воздействует на причину заболевания¹
- ✔ **Способствует ускорению** процесса исчезновения симптоматики (кожных высыпаний, зуда и т. д.)^{2**}
- ✔ **Способствует пролонгации** безрецидивного периода^{3,4}
- ✔ **Обладает более высокой биодоступностью** по сравнению с ацикловиром^{1,5}
- ✔ **Удобный режим приёма:** уменьшает кратность приёма и количество таблеток на курс лечения при рецидиве ГГ^{3,4,5}

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Валвир <http://grls.rosminzdrav.ru>, доступ от 09.11.2023

2. Spruance S.L., Tyring S.K., DeGregorio B., et. al., A Large-Scale, Placebo-Controlled, Dose-Ranging Trial of Peroral Valaciclovir for Episodic Treatment of Recurrent Herpes Genitalis, Valaciclovir HSV Study Group. Arch Intern Med. 1996 Aug 12-26;156(15):1729-35.

3. Горячкина М.В., Белоусова Т.А., Эпизодическая и супрессивная терапия простого герпеса ациклическими нуклеозидами, Клиническая дерматология и венерология №4/2014, с. 68-74.

4. Patel R, Bodsworth NJ, Woolley P et al. Valaciclovir for the suppression of recurrent genital HSV infection: a placebo-controlled study of once daily therapy. Genitourin Med, 1997; 73:105-9.

5. ИМП Ацикловир-Акри, <http://grls.rosminzdrav.ru>, доступ от 09.12.2023

* Имеется в виду снижение кратности/частоты приема по сравнению с ацикловиром.

** Для пациентов с генитальным герпесом по сравнению с группой плацебо.



Валвир

удобная^{3,4} терапия опоясывающего герпеса¹, способствующая купированию болевого синдрома^{1,2}

Валацикловир в лечении опоясывающего герпеса:

- ✓ Способствует снижению частоты развития постгерпетической невралгии¹⁻³
- ✓ Способствует сокращению продолжительности болевого синдрома¹⁻³
- ✓ Имеет удобный режим приема: способствует уменьшению кратности приема и количества таблеток на курс лечения (1000 мг 3 раза в день в течение 7 дней)^{1,4}
- ✓ Применяется для лечения офтальмического опоясывающего герпеса¹



1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Валвир <http://grls.rosminzdrav.ru>, доступ от 20.12.2023
2. Beutner KR, Friedman DJ, Forszpaniak C, et. al. Valaciclovir compared with acyclovir for improved therapy for herpes zoster in immunocompetent adults. Antimicrob Agents Chemother. 1995 Jul;39(7):1546-53.
3. Халдин А.А. и соавт., Опоясывающий герпес: современные особенности клиники и принципы терапевтической тактики, Клиническая дерматология и венерология, 1, 2015, с.77-81.
4. Имеется в виду снижение кратности/частоты приема по сравнению с ацикловиром

Схема применения препарата Валвир¹

Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса (включая генитальный и лабиальный герпес)◆:	Первичный герпес	500 мг 2 раза в сутки	10 дней
	Рецидив генитального или лабиального герпеса	500 мг 2 раза в сутки	3 или 5 дней
	Рецидив лабиального герпеса*	2000 мг 2 раза в сутки	в течение 1 суток**
Профилактика рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса	У пациентов с сохраненным иммунитетом◆	500 мг 1 раз в сутки	Через 6-12 месяцев лечения необходимо оценить эффективность терапии
	У взрослых пациентов с иммунодефицитом	500 мг 2 раза в сутки	
Опоясывающий герпес и офтальмический опоясывающий герпес у взрослых пациентов		1000 мг 3 раза в сутки	7 дней
Профилактика инфекций, вызванных Цитомегаловирусом и заболеваний после трансплантации паренхиматозных органов◆		2000 мг 4 раза в сутки	90 дней

* альтернативная схема лечения рецидива лабиального герпеса

◆ Иммунокомпетентные взрослые и подростки в возрасте от 12 до 18 лет

** вторая доза должна быть принята примерно через 12 ч (но не раньше, чем через 6 ч) после первой дозы

Сокращенная информация по применению лекарственного препарата Валвир

Регистрационный номер: ЛП-№(002476)-(РГ-RU) от 05.06.23. Торговое наименование препарата: Валвир. Международное непатентованное наименование: Валацикловир. Действующее вещество: Валацикловир 500 и 1000 мг. Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Фармакотерапевтическая группа: Противовирусные средства системного действия; противовирусные средства прямого действия; нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы. Код АТХ: J05AB11. Показания к применению: Взрослые и подростки в возрасте от 12 до 18 лет: лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса (ВПГ), включая впервые выявленный и рецидивирующий генитальный герпес (*Herpes genitalis*), а также лабиальный герпес (*Herpes labialis*); профилактика (супрессия) рецидивов инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных ВПГ, включая генитальный герпес, в том числе у взрослых с иммунодефицитом; профилактика инфекций, вызванных цитомегаловирусом (ЦМВ), и заболеваний после трансплантации паренхиматозных органов. Взрослые: лечение опоясывающего герпеса (*Herpes zoster*) и офтальмического опоясывающего герпеса. Режим дозирования и способ применения (полную информацию см. в общей характеристике лекарственного препарата): препарат Валвир можно принимать вне зависимости от приема пищи, таблетки следует запивать водой. Лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных ВПГ, включая впервые выявленный и рецидивирующий генитальный и лабиальный герпес: иммунокомпетентные взрослые и подростки от 12 до 18 лет - 500 мг 2 раза в сутки. В случае рецидивов лечение должно продолжаться 3 или 5 дней. В случае первичного герпеса продолжительность лечения должна быть увеличена с 5 до 10 дней. В качестве альтернативного лечения лабиального герпеса эффективно назначение препарата Валвир в дозе 2000 мг 2 раза в сутки в течение 1 суток. Вторая доза должна быть принята приблизительно через 12 часов (но не раньше, чем через 6 часов) после приема первой дозы, при этом продолжительность лечения не должна превышать 1 сутки. Профилактика (супрессия) рецидивов инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных ВПГ, включая генитальный герпес: иммунокомпетентные взрослые и подростки от 12 до 18 лет - 500 мг 1 раз в сутки. Взрослые с иммунодефицитом - 500 мг 2 раза в сутки. Через 6-12 месяцев лечения необходимо оценить эффективность терапии. Профилактика инфекций, вызванных ЦМВ, и заболеваний после трансплантации паренхиматозных органов: взрослые и подростки от 12 до 18 лет - 2000 мг 4 раза в сутки, назначается как можно раньше, после трансплантации. Продолжительность лечения обычно составляет 90 дней. Лечение опоясывающего герпеса и офтальмического опоясывающего герпеса у взрослых - 1000 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Противопоказания: повышенная чувствительность к валацикловиру, ацикловиру и любому другому компоненту, входящему в состав препарата, детский возраст до 12 лет, детский возраст до 18 лет при лечении опоясывающего герпеса и офтальмического опоясывающего герпеса. Нежелательные реакции (полную информацию см. в общей характеристике лекарственного препарата): головная боль, тошнота. Особые указания и меры предосторожности (полную информацию см. в общей характеристике лекарственного препарата): у пациентов с почечной недостаточностью; пациентов с клинически выраженными формами ВИЧ-инфекции; при одновременном приеме нефротоксичных лекарственных средств. Срок годности: 2 года. Условия отпуска: по рецепту.

Полная информация по препарату содержится в общей характеристике лекарственного препарата.



Общество с ограниченной ответственностью «Тева»

Россия, Москва, 115054, ул. Валовая, д. 35 | Тел. +7(495)644-22-34 | Факс +7(495)644-22-35 | www.teva.ru

Представленные данные отражают точку зрения автора, которая может не совпадать с мнением ООО «Тева»

Отпускается по рецепту. Предназначено для информирования специалистов здравоохранения. Не предназначено для демонстрации пациентам